



ТИЛОВЕТ 200[®]

раствор для инъекций

СОСТАВ

Тилозина тартрат, эквивалентный тилозину
основанию - 0,2 г
Вспомогательные компоненты до 1,0 мл

ДЕЙСТВИЕ

Тилозин является макролидным бактериостатическим антибиотиком, проявляющим активность в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, простейших и крупных вирусов; кокков, клостридий, эризипелотриксков, пастерелл, серпулин (спирохет), вибрионов, лептоспир, бруцелл, нейсерий, риккетсий, гемофилюсов, хламидий и некоторых анаэробных микроорганизмов и др. Проявляет высокую активность в отношении микоплазм. При внутримышечном введении хорошо всасывается из места инъекции и достигает максимальной концентрации в крови через 1 час после инъекции. В течение первых восьми часов уровень антибиотика в крови выше, чем после введения в тех же дозах препарата Тиловет В-200. Выделяется преимущественно с мочой и желчью, у лактирующих животных - с молоком, у самцов - со спермой. Совместим с тетрациклинами, сульфаниламидами, эритромицином, спектиномицином. Чувствителен к свету (разлагается).

ПОКАЗАНИЯ

При респираторных заболеваниях крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак (риниты, тонзиллиты, ларингиты, бронхиты, пневмонии и др.); при некротическом энтерите, роже, энзоотической бронхопневмонии, дизентерии свиней; маститах и эндометритах; инфекционной агалактии овец и коз; артритах микоплазменной этиологии; вибриозе коров и овец; панарициуме, отитах и раневых инфекциях; при лептоспирозе, инфекционном конъюнктивите телят и коров.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять лошадям, кроликам, морским свинкам, хомячкам и новорожденным животным.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутримышечно! Не вводить больше 10 мл в одно место.

ДОЗЫ

Крупный рогатый скот - 3-5 мл/100 кг массы тела
Телята - 2,5 мл/50 кг массы тела
Мелкий рогатый скот - 3 мл/50 кг массы тела
Свиньи - 2,5 мл/50 кг массы тела
Собаки - 0,5 мл/10 кг массы тела
Кратность применения 1 раз в сутки.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Убой животных на мясо и употребление молока в пищу разрешается не ранее, чем через 5 дней после прекращения применения препарата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В оригинальной упаковке изготовителя, в сухом, защищенном от света месте при температуре 8-15°C.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня изготовления.

РАСФАСОВКА

Флаконы по 50 мл.