

# СВИНЕ



## ПРОДУКТ

## ЗАБОЛЯВАНЕ

<p><b>APRAMYCIN 500 mg/g</b> водоразтворим прах</p>	<p>За лечение и профилактика на инфекции на храносмилателния канал, причинени от чувствителни към действието на апрамицин патогенни микроорганизми - главно колибактериози и салмонелози.</p>
<p><b>AMOXYVET 500 mg/g</b> прах за перорален разтвор</p>	<p>При некротични ентерити, причинени от <i>Clostridium</i> spp.; при колибактериози, причинени от чувствителни щамове на <i>Escherichia coli</i>; при салмонелози, причинени от чувствителни <i>Salmonella</i> spp.; при инфекции, причинени от <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp. и др., чувствителни към амоксицилин микроорганизми.</p>
<p><b>ANALGIN</b> инж. разтвор</p>	<p>При спазми на маточната шийка по време на раждане, болки от пикочен и жлъчен произход; нефрити; запушване на хранопровода; ставен и мускулен ревматизъм.</p>
<p><b>BIOMEZIN</b> Премикс</p>	<p>За лечение на бронхити, бронхопневмонии и пневмонии; при септични състояния при новородени прасета; при пастъорелоза, червенка, следродилни инфекции и мастити; при едемна болест, колибактериоза и дизентерия; при фурунколоза, паранициум, раневи инфекции.</p>
<p><b>BIOSELET E</b> инж. разтвор</p>	<p>При мускулна дистрофия, за стимулиране на прираста, при стресови ситуации; при случаи на безплодие; при диетична хепатоза; за повишаване на устойчивостта срещу заболявания при младите животни.</p>
<p><b>BIOVIT</b> премикс</p>	<p>За профилактика и лечение на лептоспироза, бактериален ентерит, бактериална пневмония, цервикални абсцеси.</p>
<p><b>DIAR STOP FORTE</b> Премикс</p>	<p>За лечение на неспецифични възпалителни заболявания на храносмилателния канал - диарии от различен произход с и без гнилостни процеси; на отравяния.</p>
<p><b>FENBIVET</b> Премикс</p>	<p>При нематодози при всички категории свине (подрастващи, угояване, свине-майки), причинени от паразитирането на <i>Hyoststrongylus rubidus</i>, <i>Ascaris suum</i>, <i>Oesophagostomum</i> spp., <i>Trichuris suis</i>, <i>Strongyloides ransomi</i>, <i>Metastrongylus</i> spp., <i>Stephanurus dentatus</i>.</p>

# СВИНЕ



## ПРОДУКТ

## ЗАБОЛЯВАНЕ

**GENTAMYCIN**  
инж. Разтвор

За лечение на инфекции на пикочните пътища, дихателни инфекции, стомашно-чревни инфекции със септични състояния, метрит, инфекции на меките тъкани и на кожата. Прилага се най-вече при инфекции, причинени от бактерии, резистентни към други антибиотици като *E. coli* и *Pseudomonas aeruginosa*.

**HydroDoxh**  
10%, 50%  
водоразтворим  
премикс

За лечение на респираторни инфекции, причинени от *Mycoplasma hyorheumoniae* (ензоотична пневмония); *Actinobacillus pleuropneumoniae* (актинобацилна плевропневмония); *Haemophilus parasuis* (хемофилна пневмония или глесерова болест); *Pasteurella multocida* (пастъорелоза); *Bordetella bronchiseptica* и др. Инфекции причинени от микроорганизми чувствителни към доксициклин: атрофичен ринит; салмонелоза; епиритрозооза; колибактериоза; некротичен ентерит; дизентерия и лептоспироза. Профилактично (метафилактично) при стресови състояния след отбиване, преместване, регрупиране и транспорт.

**OXYTOSIN**  
инж. Разтвор

За стимулиране на родовата дейност при слаби и неефективни контракции на матката (само при отворена маточна шийка); при атония на матката след раждане; при след родилни маточни кръвотечения; при задържане на плацентата; при пуерперални ендометрити; при изпадане на матката; при пиометра; при хипогалакция и агалакция след раждане; при задържане на млякото.

**OXYTETRACYCLIN**  
инж. Разтвор

При инфекции на дихателните и пикочно-половите пътища стомашно-чревния тракт, меките тъкани; при септични състояния, вторични бактериални инфекции при вирусни заболявания и др., причинени от чувствителни към окситетрациклина патогенни микроорганизми (колибактериози, салмонелози, пастъорелози, лептоспироза, листериоза, бронхопневмонии, актинобацилоза, червенка, антракс); MMA синдром при свине-майки, метрити, мастити, постоперативни състояния, пиелонефрити, тетанус, инфекциозни полиартрити, спирохетоза.

**PANDEX 1%**

При нематогози (аскаридоза, стронгилоидоза, хиостронгилоидоза, метастронгилоидоза, езофагостомоза), при инвазия с въшки и при саркоптесова краста.

# СВИНЕ



## ПРОДУКТ

## ЗАБОЛЯВАНЕ

### **PANDEX 0.6%** **премикс**

За лечение и контрол на паразитози при растящи прасета и свине, по време на всички фази от репродуктивния цикъл, предизвикани от следните паразити: Стомашно-чревни нематоди (възрастни и L4) *Ascaris suum*, *Oesophagostomum spp.*, *Hyostrongylus rubidus*, *Ascarops strongylina*, *Strongyloides ransomi* (ивермектинът, включван в храната, приема на от бременни женски свине преди раждане, предотвратява предаване чрез млекото на *S. ransomi* на прасенцата); Бъбречни нематоди (възрастни и L4) *Stephanurus dentatus*; Белодробни нематоди (възрастни) *Metastrongylus spp.*; Въшки *Haematopius suis*; Крастни кърлежу *Sarcoptes scabiei* var. *Suis*.

### **PANVET 50 mg/g** **премикс**

При заразни ентерити, причинени от грам-отрицателни бактерии, чувствителни към колистин: най-често *Salmonella spp.*, *E. coli*, *Shigela spp.*, *Haemophilus*, *Pseudomonas*, а също *Aerobacter* и *Pasteurella* spp.

### **RODOTIUM 10%** **премикс**

За профилактика (метафилактика) и лечение на ензоотична пневмония, актинобацилна плевропневмония, респираторен болестен комплекс, дизентерия (кървава диария), пролиферативна ентеропатия (илеит) и колонова спирохетоза; в случаите на завишена заболяемост и смъртност с неизяснена етиология; за преодоляване на стреса след отбиване, преместване, регрупиране и дълъг транспорт; за подтискане на вторични бактериални инфекции при PRRS (Репродуктивен и респираторен синдром) и други вирусни инфекции

### **RODOTIUM 45%** **премикс**

За лечение и профилактика на дизентерия, колонна спирохетоза, спирохетен ентероколит, ензоотична бронхопневмония и микоплазмени артрити при свине

### **RODOTET** **Премикс**

За профилактика (метафилактика) и лечение на ензоотична пневмония, актинобацилна плевропневмония, респираторен болестен комплекс, дизентерия (кървава диария), пролиферативна ентеропатия (илеит) и колонова спирохетоза; в случаите на завишена заболяемост и смъртност с неизяснена етиология; за преодоляване на стреса след отбиване, преместване, регрупиране и дълъг транспорт; за подтискане на вторични бактериални инфекции при PRRS (Репродуктивен и респираторен синдром) и други вирусни инфекции

# СВИНЕ



## ПРОДУКТ

## ЗАБОЛЯВАНЕ

**TILMOVET 20% - премикс**

При бактериални респираторни заболявания, предизвикани от *M. hyopneumoniae* (ензоотична пневмония); *A. pleuropneumoniae* (актинобацилна плевропневмония); *H. parasuis* (хемофилна пневмония или глесерова болест); *P. multocida* (пастъорелоза); *B. bronchiseptica* и др. Вторични бактериални инфекции при репродуктивен и респираторен синдром при свинете (PRRS) и цирковирална инфекция при свинете (синдром на мултисистемно слабее на прасета след отбиване PMWS и синдром на гермонефрит при прасета - PDNS); Бактериални инфекции на храносмилателния тракт, предизвикани от *B. hyodysenteriae* (класическа дизентерия); *L. intracellularis* (пролиферативен или хеморагичен илеит); *B. pilosicoli* (колонова спирохетоза); *Staphylococcus spp.* и *Streptococcus spp.*; Профилактично (метафилактично) при стресови състояния след отбиване, преместване, регрупиране и транспорт.

**TYLOVET PULVIS - водоразтворим прах**

За профилактика и лечение на дизентерия и ензоотична пневмония при свине.

**TYLOVET B 200 инж. разтвор**

При респираторни заболявания (ринити, тонзилити, ларингити, бронхити, пневмонии и др.); при некротичен ентерит, червенка, ензоотична бронхопневмония, дизентерия у свине; при мастити и ендометрити, при артрити на микоплазмена основа; и инфектирани рани; лептоспироза.

**TYLOVET 10%, 25% - премикс**

За профилактика и лечение на инфекции, предизвикани от чувствителни към действието на тилозина патогенни микроорганизми - микоплазмоза, дизентерия.

**VIALITON инж. разтвор**

При А, D<sub>3</sub> и Е хипо- и авитаминози. За увеличаване на общата резистентност на организма, при рахит, остеомаляция и ставни заболявания, при увреждане на кожата и лигавиците, при смущения в сперматогенезата и при импотентност на разплодниците; при изоставащи в развитието си прасета.

**VITAMIN C инж. разтвор**

При хиповитаминоза С; при възпалителни фебрилни заболявания (заразни и незаразни болести) - пневмонии, бронхопневмонии, ревматизъм, хепатити, нефрити, ентероколити, фурункулози; кръвотечения, хеморагични диатези; при ексудативни състояния, алергични заболявания - уртикария, при интоксикации с токсични съединения и лекарствени средства (арсенови съединения, тежки метали, феноли, в това число салицилати, сулфаниламиди, барбитурати, синтетични естрогени, алкохол); при хипохромни анемии; при трудно зарастващи рани и фрактури; при бременност, като имуностимулатор (неспецифичен); при бактериални и вирусни заболявания (високи дози) и др.