

СХЕМА			
За профилактика и терапия на свине с <i>Родотет - премикс</i>			
№	И н д и к а ц и и	Продължителност на третиране	Доза в kg / t фураж
1.	Лечение на Ензоотична бронхопневмония, Актинобациларна плевропневмония и Респираторен болестен комплекс При поява на първите респираторни признаци (кихане, кашлица, затруднено дишане, цианоза), болните прасета се заделят и се инжектират с Родотиум 10% - инжекционен разтвор 3 дни подред, в доза 1 ml / 10 kg м. Цялата засегната група се храни с фураж, съдържащ Родотет - премикс .	10 дни	4,5
2.	Лечение на дизентерия, колонова спирохетоза и илеит При поява на първите признаци (кървава или зеленикава диария), болните прасета се заделят и се инжектират с Родотиум 10% - инжекционен разтвор 1 - 2 дни подред, в зависимост от тежестта на заболяването, в доза 1 ml / 10 kg м. Цялата засегната група се храни с фураж, съдържащ Родотет - премикс .	10 дни	3,0
3.	Профилактика на Ензоотична бронхопневмония, Актинобациларна плевропневмония и Респираторен болестен комплекс Прасетата получават фураж, съдържащ Родотет – премикс , като третирането започва една седмица преди възрастта на която обикновено се появяват заболяванията.	3 седмици	1,5
4.	Профилактика на дизентерия, колонова спирохетоза и илеит Прасетата получават фураж, съдържащ Родотет – премикс , като третирането започва една седмица преди възрастта на която обикновено се появяват заболяванията.	3 седмици	1,5
5.	При завишена заболяемост и смъртност с неизяснена етиология Цялата засегната група се храни с фураж, съдържащ Родотет – премикс , като първите две седмици се добавя по-високата доза, а следващите две – по-ниската.	2 седмици	3,0
		2 седмици	1,5
6.	Преодоляване на стреса след отбиване, преместване, прегрупиране и транспорт От момента на отбиване, преместване, прегрупиране и транспорт прасетата получават фураж, съдържащ Родотет – премикс .	2 - 3 седмици	1,5
7.	За подтискане на вторични бактериални инфекции при PRRS и други вирусни инфекции При поява на симптоми на първичното заболяване, болните прасета се заделят и се инжектират с Родотиум 10% - инжекционен разтвор 3 дни подред, в доза 1 ml / 10 kg м. Цялата засегната група се храни с фураж, съдържащ Родотет - премикс .	7 – 10 дни	1,5
8.	Преодоляване на стрес от опрасването на свинете и профилактика на ММА - синдром Свинете получават фураж, съдържащ Родотет – премикс .	5 дни преди 10 дни след опрасване	1,5

Профилактична програма за терапия с <i>Родотет – премикс</i> през целия период на отглеждане на прасета							
Режим	Третиране	Пауза	Третиране	Пауза	Третиране	Пауза	Третиране
Продължителност в дни	14	14	7	10	5	20	5
Възраст на прасетата в дни	31 - 44	45 – 58	59 - 65	66 - 75	76 - 80	81 - 100	101 - 105