

SACOX 120

premix microGranulatum

СЪСТАВ

1г съдържа:
Salinomycinum natricum

120 mg



ФАРМАКОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Sacox 120 МикроГранулам е полиетерен антибиотик от групата на юнофорите. Притежава антимикробен ефект срещу всички видове причинители на кокцидиоза при птиците и при други животни. Активен е срещу Грам-положителни микроорганизми, някои анаероби и *Serpulina* (Теоропета) *hyodysenteriae*. Биологичната активност на салиномицина се основава на способността му да образува комплекси с юоните на едноосновните метали, които правят клетъчните мембрани на кокцидиите пропускливи за споменатите юони. По този начин се наруша вътреклетъчната концентрация на юоните в клетките на паразитите и се проявява антимикобактериалният ефект на антибиотика. Това действие се проявява още в най-ранния стадий от развитието на кокцидиите.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Sacox 120 МикроГранулам е фуражна добавка, прилагана профилактично срещу кокцидиоза, предизвикана от *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. tenella* и *E. brunetti* при пилета-бройлери и при пилета, отглеждани за носачки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Опасен за коне и пуйки.

Този фураж съдържа юнофорен антибиотик: едновременното използване с някои лекарствени средства (например тиамулин) е противопоказано. Животни, включително птици, не трябва да бъдат третирани с продукти, съдържащи тиамулин, по време на или най-малко 7 дни преди или след приемане на фураж, съдържащ продукта. Това може да доведе до сериозно помискане на растежа или смърт.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Не са установени.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Препараторът е несъвместим с тиамулин (животните не трябва да се третират със салиномицин най-малко 7 дни преди включване и 7 дни след изключване на тиамулина от лечебната и профилактична схема).

SACOX 120

premix microGranulatum

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Вътрешно, много добре размесен с фуражка. За да се осигури хомогенно смесване, SacoX 120 МикроГранулат се разрежда предварително в междинен премикс, преди включване в крайния фураж.



ДОЗИРОВКА

Прицелни видове	Минимално и максимално съдържание на салиномицин в крайния фураж (ppm)	Количество sacox 120 в крайния фураж (g/тон фураж)	Максимална възраст
Пилета-бройлери	60 - 70	500 - 583	-
Пилета, отглеждани за носачки	50	417	12 седмици

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

КАРЕНТЕН СРОК

За птици - 1 ден ;
За зайци-5 дни.

СЪХРАНЕНИЕ

В оригинална опаковка, добре затворена, в сухи и проветриви складови помещения на защитено от пряка слънчева светлина място.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Вреден за диви животни. Да не се оставя или изхвърля на места, достъпни за животни, за които не е предназначен, или за диви животни.

ОПАКОВКА

Торби по 20kg.